



لیندان - گیالارانکو ۱٪

لیندان شامپو

دسته دارویی: شپش‌کش
فارماکوکینتیک: لیندان به مقدار قابل توجهی از طریق پوست جذب می‌گردد و سیستم عصبی مرکزی (CNS) را تحریک می‌کند. لیندان به دنبال جذب از پوست کینینی بند پایان (CNS) آنها را تحریک کرده و باعث تشنج و مرگ این جانداران می‌شود.

موارد مصرف: شامپو لیندان برای درمان آلودگی ناشی از شپش انسانی گونه کاپیتیس (شپش سر) و قتیروس پوبیس (شپشک زهار) مصرف می‌شود. **مقدار و روش استفاده:**

- پیش از مصرف باید پوست و مو کاملاً تمیز و عاری از رطوبت و هر نوع چربی (اعم از لوسیون، کرم، پماد، مرطوب‌کننده و درمورد مو فرآورده‌های روغنی و حالت دهنده) گردد. ابتدا به حمام رفته و موها را با یک شامپوی دیگر کاملاً شسته، آبکشی کرده و کاملاً خشک نمایید.
- حداقل ۱ ساعت صبر کنید و سپس شامپو را به صورت زیر استفاده نمایید:
- ۱- شامپو را مستقیماً و بدون اضافه کردن آب بر روی موها ریخته و موها به ویژه موهای ریز ناحیه گردن را با شامپو آغشته نمایید. (برای موهای بلند شامپوی کامل برای موهای متوسط ۳/۴ شامپو، برای موهای کوتاه از نصف شامپو استفاده نمایید)
- ۲- پس از ۴ دقیقه مقدار کمی آب بر روی موها ریخته و ماساژ دهید تا کف کافی تشکیل شود. سپس بلافاصله کف‌ها را آبکشی نمایید.
- ۳- موها را با حوله به سرعت خشک کرده و سپس با شانه داخل جعبه بقایای حشره را از لایه لای موها خارج نمایید.
- ۴- پس از استفاده از لیندان از استفاده از هر نوع پوشش (کلاه یا حوله) بر روی موها خودداری نمایید.
- ۵- از تماس غیر ضروری کف شامپو با سایر قسمت‌های بدن خودداری نمایید.
- ۶- بیش از یک بطری برای بزرگسالان مصرف نشود.

نحوه شانه کردن:

موهای سر را به چند قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را طبق روش زیر شانه نمایید.

ابتدا موی سر را با شانه معمولی شانه کنید تا موها صاف و گره مو باز شود. سپس نوک شانه دندان‌ریز را به سمت خود گرفته و مقداری از مو را از کف سر به صورتی که شانه ابتدا چسبیده به کف سر باشد، به سمت انتهای مو شانه نمایید. بعد از هر بار شانه کردن با دستمال کاغذی، شپش‌ها را از شانه جدا کنید و دستمال کاغذی را در کیسه پلاستیکی بریزید. موهای شانه شده را با یک کلیس از قسمت‌های شانه شده جدا نموده و قسمت‌های دیگر موها به همین ترتیب تا شانه شدن تمامی موها ادامه دهید. سپس کلیس‌ها را جدا نموده و مجدداً موها را با آب گرم شستشو دهید.

تداخل دارویی: داروهای پایین آورنده آستانه تشنج (مانند داروهای ضد جنون و ضد افسردگی، تئوفیلین، متوکاربامول، مواد حاجب، ایزونیاژید، هیدروکینون، پنی سیلینها و ...)

مصرف همزمان سایر فرآورده‌های پوستی مانند کرهما، لوسیونها، پمادها یا روغن‌ها با این دارو ممکن است جذب پوستی لیندان را افزایش دهد.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی که در مصرف لیندان مشاهده می‌شود بسیار وابسته به کاربرد، مقدار و زمان باقی ماندن لیندان بر روی پوست می‌باشد. التهاب پوست، بثورات پوستی و علائم مسمومیت (CNS) ممکن است ظاهر گردد.

تکات قابل توجه:

- ۱- شامپو را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. ۲- پیش از مصرف پوست و عاری از رطوبت و هر نوع چربی (اعم از لوسیون، کرم، پماد، مرطوب‌کننده و درمورد مو فرآورده‌های روغنی و حالت دهنده) گردد.
- ۳- این دارو باید در بیماری‌هایی که به خط اول درمان جواب نمی‌دهند یا داروهای خط اول درمان مثل پرمترین و کروتامیتون را نمی‌توانند تحمل کنند مورد استفاده قرار گیرد.
- ۴- این دارو فقط برای یک بار مصرف است. از این شامپو برای درمان مجدد یا مصرف معمولی استفاده نشود.
- ۵- در صورت حساسیت به لیندان یا موارد مشابه مصرف نشود.
- ۶- از تماس فرآورده با چشم، سطوح مخاطی و پوست زخمی و ملتهب خودداری شود. در صورت تماس اتفاقی بلافاصله با آب فراوان شسته شود.
- ۷- تمام لباس‌ها، ملحفه و حوله‌های بیمار را با آب داغ شسته و یا با اسپری ویژه البسه درمین آغشته گردد. ۸- تمامی افراد خانواده فرد مبتلا نیز باید همزمان درمان گردند.
- ۹- این دارو برای استعمال خارجی است. ۱۰- این دارو خوراکی نیست. ۱۱- در صورت استفاده نادرست، این دارو می‌تواند سمی باشد.
- ۱۲- برای جلوگیری از آلودگی مجدد، از لباسهایی که به تازگی شسته و خشک شده‌اند استفاده شود.
- ۱۳- ادامه یافتن خارش پس از درمان با دارو طبیعی است و مصرف مجدد این فرآورده پس از کامل شدن یک دوره درمانی مورد تایید قرار نگرفته است.

موارد احتیاط:

مصرف لیندان به دلیل بالا بودن احتمال تشنج در این افراد باید با احتیاط صورت گیرد:

کودکان، سالخوردگان، بیماران با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم مبتلا به عفونت HIV، سابقه ضربه به سر، صرع، تومور مغزی، سیروز حاد کبدی، افراد الکلی که به صورت ناگهانی الکلی یا داروهای خواب‌آور را ترک کرده‌اند و افرادی که داروهای پایین آورنده آستانه تشنج را مصرف می‌کنند (مانند داروهای ضد جنون و ضد افسردگی تئوفیلین، متوکاربامول، مواد حاجب، ایزونیاژید، هیدروکینون، پنی سیلینها و ...) و زنان باردار.

مصرف:

- ۱- پیشگیری از جذب ۲- افراد با سابقه تشنج به خصوص تشنج‌های غیر قابل کنترل ۳- افرادی که زخم‌های باز یا پوست ترک خورده دارند ۴- افراد با سابقه حساسیت و عارضه مصرف با لیندان ۵- نوزادان نارس یا تازه متولد شده ۶- خانم‌ها در زمان شیردهی ۷- افرادی که در طی چند ماه گذشته از این دارو استفاده نموده‌اند.

شواهد نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. از یخ‌زدگی محافظت نمایید. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

مرحله اول: درمان

